

NHIỄM KHUẨN HUYẾT

I. Chẩn đoán

1. Lâm sàng

- Hội chứng NT-NĐ nặng :Sốt cao,rét run liên tiếp
- Phản ứng hệ liên võng nội mô:Gan-lách to
- Triệu chứng của ổ di bệnh
- Tìm đường vào của ổ nhiễm khuẩn tiên phát

2.Xét nghiệm.

- 1.1.Công thức máu:BC tăng cao,chủ yếu là BCDNTT
- 2.2.Sinh hóa:Ure,Creatinin,AST,ALT tăng
- 2.3.Cấy máu,dịch(+)
- 2.4.XQ,siêu âm:Xác định ổ NT tiên phát và ổ di bệnh

II. Điều trị

*1.Điều trị căn nguyên:*KS theo phỏng đoán lâm bệnh

- VK Gr (+):Cephazoline hoặc Oxacilline hoặc Vancomycine kết hợp với Amikacine hoặc Ciprofloxacin
- VK Gr(-):Ceftazidime hoặc Ceftriaxone hoặc Cefoperazone hoặc Fosmicine kết hợp Ciprofloxacin hoặc Metronidazol
- VK kỵ khí:Cefipim,Metronidazol hoặc Clindamycin

2.Điều trị triệu chứng

- Đảm bảo hô hấp.
- Bù nước-điện giải,Hạ sốt.

- Nuôi dưỡng qua sonde , đường TM

- Giải quyết các ổ nhiễm trùng tiên phát nếu có